

재질 : 모조지70g  
색상 : 먹(K) 1도

150x200

R-01,0

전문의약품  
분류번호: 332

## 멜라스민 캡슐

(트라넥삼산)

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐 중  
• 유효성분 : 트라넥삼산(IP) ..... 250mg  
• 첨가제(타르색소) : 적색 3호, 황색 5호, 황색 203호  
• 기타첨가제 : 스테아로신마그네슘, 옥수수전분, 캡슐, 크로스카르멜로오스나트륨

**[성상]** 흰색 분말이 든 상부 주황색, 하부 담황색의 경질캡슐

**[효능 · 효과]**  
1. 전신적 섬유소용해항진과 관련 있다고 생각되는 출혈 경향 (백혈병, 재생불량성 빈혈, 자반병, 암 등 및 수술 중 · 수술 후의 이상 출혈)  
2. 국소적 섬유소용해항진과 관련 있다고 생각되는 이상출혈 (폐출혈, 성기출혈, 신 출혈, 전립선 수술 중 · 수술 후의 이상 출혈)

**[용법 · 용량]**  
트라넥사민으로서 보통 성인 1일 750~2000mg을 3~4회에 분할 경구투여한다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

**[사용상의 주의사항]**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 트롬빈을 투여 중인 환자
  - 2) 증증 신부전 환자 (족적의 위험이 있다.)
  - 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에過민반응 환자
  - 4) 활동성 혈전색전증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
  - 1) 혈전이 있는 환자(뇌혈전 심근경색, 혈전성맥염 등) 및 혈전증을 일으킬 우려가 있는 환자(혈전을 안정화할 우려가 있다.)
  - 2) 소모성 응고장애가 있는 환자(헤파린등과 병용한다.) (혈전을 안정화할 우려가 있다.)
  - 3) 수술 후 침대에 누워있는 환자 및 암박지혈 처치중인 환자 (정맥혈전이 생기기 쉬운 상태이므로, 이 약을 투여하면 혈전이 생길 가능성이 커진다. 침대를 옮기거나, 암박을 증가한 이후 폐색전증이 발생한 예가 보고되었다.)
  - 4) 신부전 환자(혈증증도가 상승될 수 있다.)
  - 5) 이 약은 황색5호(센셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
  - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 2) 과민반응 : 드물게 가려움, 발진, 홍조 등의 과민증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 3) 눈 : 일시적인 색각각이상 등이 나타날 수 있으며, 투여를 중지해야 한다.
  - 4) 비뇨기계 : 상부으로 대량혈뇨(특히 혈우병환자)가 발생한 환자에서 이 약을 사용시 요관폐쇄가 몇 건 보고되었다.
  - 5) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 설사, 속쓰림 등의 증상이 나타날 수 있다.
  - 6) 기타 : 드물게 출음, 두통, 동맥 및 정맥 혈전증이 나타날 수 있다. 드물게 혈전

**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

**[사용기간]** 용기기별 표시일까지

**[포장단위]** 30캡슐/병, 100캡슐/병

\* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변파 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.  
\* 이 첨부문서 작성일(2021.09.08) 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://new.jeyak.co.kr>이나 소비자상담실(080-010-5510)로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.  
\* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

**[제조의뢰자]** 오스틴제약(주)  
경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20

**[제조자]** (주)제뉴파마  
충청북도 청주시 바이오밸리2로 93