


규격 : 110(가로)×130(세로)mm/70모조지/반반 8등분 접지후 110×33mm



을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신항생), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려한다.

2) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 시상하부·뇌하수체·부신(HPA) 축의 억제, 쿠싱증후군, 과혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 일봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도·요증에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사한다.

3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었거나 약물사용의 증지, 투여빈도의 감소, 활성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.

4) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.

5) 증상이 개선되면 가능한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.

6) 전신 및 국소(비강내, 출입 및 인구내 포함) 코르티코이드 사용 시 시각장애가 보고될 수 있다. 만약, 환자에서 시야흐림 또는 기타 시각장애와 같은 증상이 나타나면, 전신 및 국소 코르티코이드 사용 후에 보고되었던 백내장, 녹내장 또는 중심성장액 맥락막병증(Central Serous Chorioretinopathy(CSCR))과 같은 드문 질환을 포함하여 시각장애를 일으킬 수 있는 원인을 확인하기 위하여 안과전문의에게 진료받을 것을 고려해야 한다.

5. 일부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피부도포로 인해 기형발생이 나타났다.

2) 일부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 일부 또는 일신하고 있을 가능성이 있는 부위에 대해서는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다. 판단되는 경우에만 투여한다.

3) 국소적으로 투여한 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드가 모유

중으로 이행하므로 수유부에 투여시 주의한다.

6. 소아에 대한 투여

- 1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 일봉증, 두개내압증 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다.
- 2) 기저귀 등은 일봉봉대법과 같은 적용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.
- 3) 3주 이상 연속하여 사용하지 않는다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 이상반응이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게 특히 일봉봉대법 사용할 경우 충분히 관찰하는 등 주의한다.

8. 적용상의 주의

- 1) 안과용으로 사용하지 않는다.
- 2) 화장 또는 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 3) 의사의 감독 없이 일봉봉대법을 사용하지 않는다면 특히 일봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용전에 환부를 청결히 한다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
10. 기타
- 1) 국소 코르티코이드가 실험동물의 수태능력에 미치는 영향이나 발암성 여부를 평가하는 만성시험은 실시되지 않았다.
 - 2) 이 약의 유전독성시험(Ames시험, 마우스 림프종 시험, 소핵시험)에서는 돌연변이 유발기능성이 나타나지 않았다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기간】 투브 또는 케이스, 용기리밸 표시일까지

【포장단위】 15g/투브, 30g/투브, 500g/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 첨부문서 작성일(2020.04.21) 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://new.jeyak.co.kr>이나 소비자 상담실 문의 또는 식품의약품안전처의 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)



경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20

소비자상담실: 080-010-5510