

PRODUCT LIST

제품리스트 2026.07



Austin Pharm Product List

목 차

순환기계	4P
소화기계	6P
해열, 소염, 진통제	8P
항 생 제	9P
항히스타민제	10P
비뇨기계	11P
정신신경계	12P
항진균제 · 항바이러스제	13P
피부계, 근골격계	14P
호흡기용제, 내분비계	15P

| 자사 제조 품목

분류	구분	생동 여부	품목명	성분 및 함량	대조약
순환기계	전문	생동	피타바정 1mg/2mg	pitavastatin calcium hydrate 1,102mg (1mg as pitavastatin calcium) pitavastatin calcium hydrate 2,205mg (2mg as pitavastatin calcium)	리바로정
	전문	생동	아르틴정 10mg/20mg	atorvastatin calcium 10,36mg (10mg as atorvastatin) atorvastatin calcium trihydrate 21,7mg (20mg as atorvastatin)	리피토정
소화기계	전문	생동	레보라이드정	levosulpiride 25mg	레보프라이드정
	전문	생동	아모틴정	famotidine 20mg	동아가스터정
	전문	생동	모사무라정	mosapride citrate hydrate 5,29mg (5mg as mosapride citrate)	가스모틴정
	일반	비교용출	뉴마그정	magnesium oxide 250mg	삼천당 산화마그네슘정
	일반	비교용출	삼메틴정	trimebutine maleate 150mg	포리부틴정
	일반	비급여	비시드에프정	magnesium carbonate 160mg, dried aluminum hydroxide gel 250mg	
해열진통 소염제	전문	생동	플루마겐정	talniflumate 370mg	소말겐정
	전문	생동	디워렌정	acetaminophen 325mg, tramadol hydrochloride 37,5mg	울트라셋정
	일반	비교용출	맥스펜정	dexibuprofen 300mg	애니펜
항히스 타민제	전문	생동	에피나정	epinastine hydrochloride 10mg	알레스틴정
	전문	생동	알씨텍정	levocetirizine hydrochloride 5mg	씨잘정
	일반	비교용출	알지렉스정	cetirizine hydrochloride 10mg	지르텍정
내분비계	일반	비급여	미시랜더캡슐	green tea powder 250mg (5mg as caffeine), orthosiphon powder 150mg	
항진균제	전문	생동	다코나졸캡슐	fluconazole 50mg	디푸루칸캡슐
항바이러스제	전문	생동	팜시빌정	famciclovir 250mg	팜비어정
피부계	전문	생동	멜라스민캡슐	tranexamic acid 250mg	도란사민캡슐
	전문	크림제	베스톱크림	prednicarbate 2,5mg/g	더마톱크림
	일반	크림제	센다실크림1%	terbinafine hydrochloride 10mg/g (8,888mg/g as terbinafine)	
	전문	크림제	모메손크림	mometasone furoate 1mg/g	에로콤크림
	일반	크림제	다나핀크림	butenafine hydrochloride 10mg/g	
호흡기 용제	전문	생동	레보드롭정	levodropropizine 60mg	드로피진정
	일반	비교용출	오스틴암브록솔 염산염정	ambroxol hydrochloride 30mg	뮤코펙트정
	일반	비교용출	엘도텍캡슐	erdosteine 300mg	엘도스캡슐
	일반	비교용출	아세틸캡슐	acetylcysteine 200mg	뮤테란캡슐

순환기계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약 가 보침코드 표장단위	대조약 제조사
213		토르신정 5mg Torasemide 5mg	경증 내지 중등도 본태고혈압, 부중 (울혈성심부전, 간경변, 신질환).	1. 경증내지 중등도 본태고혈압 1일 1회 2.5mg를 경구투여 한다. 1일 용량을 5mg으로 증량시킬 수 있다. 2. 울혈성심부전에 기인한 부중 1일 1회 5mg를 경구투여 한다. 1일 1회 20~40mg 증량할 수 있다.	130 654302980 30T, 100T	토렘정 (메나리나)
213		토르신정 10mg Torasemide 10mg	부중(울혈성심부전, 간경변, 신질환).	3. 간경변(복수)에 기인한 부중 1일 1회 5~20mg를 경구투여 한다. 1일 용량을 40mg까지 증량할 수 있다. 4. 신질환 1일 5~20mg를 경구투여 한다. 1일 100mg까지 증량 가능.	195 654302960 30T, 100T	
214		노바텍정 Amlodipine Maleate 6.42mg (5mg as amlodipine)	고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄 또는 관상혈관계의 혈관경련수축에 의한 심근성허혈증.	1일 1회 5mg를 경구투여 하며, 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg 까지 증량할 수 있다.	188 654300210 30T, 300T	애니디핀정 (종근당)
214		뉴사탄정 160mg Valsartan 160mg	1. 본태성 고혈압. 2. 심부전 ACE억제제에 불내성(intolerant)인 심부전 (NYHA Class II~IV) 3. 심근경색 후의 사망 위험성 감소.	1일1회 80mg 경구투여가 권장된다. 혈압 조절이 잘 되지 않는 환자는 용량을 1일 160mg까지 증량하거나 이노제를 병용투여 할 수 있다. 1일 최대 320mg까지 용량을 증량할 수 있다.	830 654304690 30T	디오반 필름코팅정 (노바티스)
214		뉴스크정 5mg Amlodipine besylate 6.944mg (5mg as amlodipine)	고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형 협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근성 허혈증	암로디핀으로서 1일 1회 5mg를 경구투여 하며 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg 까지 증량할 수 있다.	312 654304860 30T, 300T	노바스크정 (비아트리스 코리아)
214		바살핀정 5/80mg Amlodipine besylate 6.94mg (5mg as amlodipine), Valsartan 80mg	암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압.	1. 1일 1회 1정으로 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다.(가능하면 매일 같은 시간에 복용할 것이 권장된다.) 2. 신장에 환자: 중증의 신장에 환자 및 투석환자는 이 약을 투여하지 않는다. 3. 간장에 환자: 경도 및 중등도 간장에 환자의 경우 발사르탄 1일 투여량은 80mg를 초과해서는 안된다. 4. 65세 이상의 고령자: 용량 증량시 주의해야 한다. 5. 소아: 이 약의 투여가 권장되지 않는다.	684 654305350 28T	엑스포지정 (노바티스)
214		바살핀정 5/160mg Amlodipine besylate 6.94mg (5mg as amlodipine), Valsartan 160mg		1. 1일 1회 1정으로 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. (가능하면 매일 같은 시간에 복용할 것이 권장된다.) 2. 신장에 환자: 중증의 신장에 환자인 경우 낮은 용량으로 치료를 시작하는 것이 권장되며, 용량을 서서히 증량한다. 3. 간장에 환자: 경증 또는 중증의 간장에 환자에 대한 텔미사르탄의 1일 투여량은 40밀리그램을 초과하지 않아야한다. 4. 고령자: 75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으 므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하며, 용량을 서서히 증량한다. 5. 소아: 이 약의 투여가 권장되지 않는다.	840 654305360 28T	
214		테살핀정 40/5mg Telmisartan 40mg, Amlodipine besylate 6.935mg (5mg as amlodipine)	텔미사르탄 또는 암로디핀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압.	1. 1일 1회 1정으로 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. (가능하면 매일 같은 시간에 복용할 것이 권장된다.) 2. 신장에 환자: 중증의 신장에 환자인 경우 낮은 용량으로 치료를 시작하는 것이 권장되며, 용량을 서서히 증량한다. 3. 간장에 환자: 경증 또는 중증의 간장에 환자에 대한 텔미사르탄의 1일 투여량은 40밀리그램을 초과하지 않아야한다. 4. 고령자: 75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으 므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하며, 용량을 서서히 증량한다. 5. 소아: 이 약의 투여가 권장되지 않는다.	600 654305330 30T	트윈스타정 (베링거 인겔하임)
214		테살핀정 80/5mg Telmisartan 80mg, Amlodipine besylate 6.935mg (5mg as amlodipine)		1. 1일 1회 1정으로 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. (가능하면 매일 같은 시간에 복용할 것이 권장된다.) 2. 신장에 환자: 중증의 신장에 환자인 경우 낮은 용량으로 치료를 시작하는 것이 권장되며, 용량을 서서히 증량한다. 3. 간장에 환자: 경증 또는 중증의 간장에 환자에 대한 텔미사르탄의 1일 투여량은 40밀리그램을 초과하지 않아야한다. 4. 고령자: 75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으 므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하며, 용량을 서서히 증량한다. 5. 소아: 이 약의 투여가 권장되지 않는다.	725 654305320 30T	

순환기계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보험코드 포장단위	대조약 제조사
214		암바스정 S-Amlodipine besylate 2.5 hydrate 3.74mg (2.5mg as s-amlodipine)	고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련수축에 의한 심근성허혈증.	1일 1회 2.5mg을 경구투여 하며, 1일 최대 5mg 까지 증량할 수 있다.	312 654304770 30T, 300T	레보틴성정 (안국)
218		아르틴정 10mg Atorvastatin calcium 10.36mg (10mg as atorvastatin)	관상동맥질환자의 심혈관계 질환 위험감소, 고지혈증	1일 1회 10mg 이나, 질환에 따라서 1일 1회 10~80mg의 용량 범위로 투여할 수 있다.	663 654304570 30T, 100T	리피토정 (비아트리스 코리아)
		아르틴정 20mg Atorvastatin calcium trihydrate 21.7mg (20mg as atorvastatin)			712 654305190 30T, 100T	
218		피타바정 Pitavastatin calcium hydrate 2.205mg (2mg as pitavastatin calcium)	원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증 환자의 상승된 총콜레 스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가 시키는 식이요법의 보조제.	1회 1~2mg을 1일 1회 저녁식사 후에 복용한다. 1일 최대 4mg까지 증량할 수 있다.	561 654304480 30T, 100T	리바로정 (JM중외)
218		피타바정 1mg pitavastatin calcium hydrate 1.102mg (1mg as pitavastatin calcium)	1. 원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상 지질혈증의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 2. 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 10세 이상-16세 이하의 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 수치를 감소시키는 식이요법의 보조제.	1. 원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증(성인) : 초회 1일 1회 1~2mg, 1일 최대 4mg 2. 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 소아(10세-16세) : 1일 1회 1mg, 1일 최대 2mg	347 654305650 30T, 100T	리바로정 (JM중외)
219		노토바정 5/10mg Amlodipine besylate 6.94mg (5mg as amlodipine), Atorvastatin calcium hydrate 10.85mg (10mg as atorvastatin)	이약은 두 약품(암로디핀:에스암로디핀과 아토르바스타틴)을 동시에 투여하여야 하는 환자에만 사용한다.	성인에 한하여 투여하며, 투여 용량은 암로디핀/ 아토르바스타틴 각 성분의 효과 및 내약성에 근거하여 각 환자에서 개별화 되어야 한다.	623 654303810 30T, 100T	카듀엣정 (비아트리스 코리아)
219		도리스 캡슐 Triflusal 300mg	혈전증에 의한 합병증을 포함한 혈전색전질환 예방과 치료 및 혈소판 응집억제.	1일 300~900mg을 식사 중 또는 식후에 분할 경구투여 한다.	405 654300440 30C, 100C	명인 디스그렌캡슐 (명인)
339		레이트정 Sarpogrelate hydrochloride 100mg	만성 동맥폐색증에 의한 궤양, 통증 및 냉감 등의 허혈성 증상 개선.	1회 100mg을 1일 3회 식후 경구투여 한다.	437 654304700 30T, 100T	안플라그정 (유한)






소화기계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보험코드 포장단위	대조약 제조사
124		티론정 Tiropramide hydrochloride 100mg	<ol style="list-style-type: none"> 다음 질환에서의 급성 경련성 동통: 간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장요관의 산통. 다음 질환에서의 복부경련 및 동통: 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착. 	1회 100mg 1일 2~3회 경구투여 한다.	115 654303020 30T, 100T	티로파정 (대웅제약)
232		무코에스정 Rebamipide 100mg	<ol style="list-style-type: none"> 위궤양 다음질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기. 	1회 100mg 1일 3회 경구투여 한다.	88 654305170 30T, 500T	무코스타정 (오츠카)
232		빠리바정 10mg Rabeprazole sodium 10mg	위,십이지장궤양 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환 위식도역류질환의 증상완화 위식도역류질환의 장기간 유지요법 헬리코박터필로리에 감염된 소화기 궤양환자에 대한 항생제 병용요법 Zollinger-Ellison 증후군	질환에 따라 1일 1회 10mg를 경구투여 한다. 증상에 따라 1일 1회 20mg 증량 가능하며, 통상 4주에서 8주 까지 투여한다. Zollinger-Ellison 증후군은 1일 60mg이며, 1일 120mg까지 조절가능하다.	454 654304710 28T	파리에트정 (에자이)
232		빠리바정 20mg Rabeprazole sodium 20mg			909 654304720 28T	
232		아모틴정 Famotidine 20mg	생동 <ol style="list-style-type: none"> 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관 출혈, 역류성식도염, Zollinger-Ellison 증후군. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기. 	<ol style="list-style-type: none"> 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부 소화관출혈, 역류성식도염, Zollinger-Ellison 증후군: 1회 20mg 1일 2회 또는 1회 40mg 1일 1회 (취침시) 경구투여 한다. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성 악화기 - 1회 10mg 1일 2회, 또는 1일 1회 경구투여 한다. 	189 654301790 30T, 200T	동아 가스타정 (동아에스티)
232		이소졸정 20mg Esomeprazole magnesium trihydrate 22.25mg (20mg as esomeprazole)	<ol style="list-style-type: none"> 위식도 역류질환(GERD) 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자 Zollinger-Ellison 증후군의 치료 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지요법 	질환에 따라 1일 1회, 1회 20mg에서 40mg 4주 복용 Zollinger-Ellison 증후군의 치료는 40mg 1일 2회 투여한다.	649 654305120 28T	넥시움정 (아스트라 제네카)
232		이소졸정 40mg Esomeprazole magnesium trihydrate 44.5mg (40mg as esomeprazole)			916 654305150 28T	

소화기계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보통코드 포장단위	대조약 제조사
234		게이트정 Almagate 500mg	다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림.	1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간 씹어서 경구복용 한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.	55 654304830 500T	알마겔정 (유한)
234		뉴마그정 Magnesium oxide 250mg	1. 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 2. 변비증	1. 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 1일 0.5-1g을 수회(여러 차례) 분할 경구투여한다. 2. 변비증 : 1일 2g을 1-2회 분할 경구투여한다.	49(예상약가) 1000T	삼천당 산화마그네슘정 (삼천당)
234		비시드에프정 Dried aluminum hydroxide gel 250mg Magnesium carbonate 160mg	위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림.	성인 1회 3정, 1일 3회 식후에 복용한다.	비급여(100) 654303860 500T	
239		삼메틴정 Trimebutine maleate 150mg	1. 식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토) 2. 과민성대장증후군 및 경련성 결장 3. 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)	성인 1회 1정, 1일 3회 식전에 경구투여한다.	63 654301390 500T	포리부틴정 (삼일)
239		레보라이드정 25mg Levosulpiride 25mg	기능성소화불량으로 인한 다음 증상의 완화: 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토	1회 25mg를 1일 3회 식전에 경구투여 한다.	119 654300680 30T, 200T	레보 프라이드정 (에스케이 케미칼 생명과학)
239		모사무라정 Mosapride citrate hydrate 5.29mg (5mg as mosapride citrate)	기능성소화불량(만성위염)에 수반하는 소화기능이상 (가슴쓰림, 오심, 구토)	1일 15mg를 3회로 나누어 식전 또는 식후에 경구투여한다.	103 654301140 30T, 200T	가스모틴정 (대웅제약)
391		디비디정 Biphenyl-dimethyl-dicarboxylate 25mg	지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염.	성인 1회 25 ~ 50 mg, 1일 3회 경구투여한다.	155 654300520 30T, 500T	낫셀정 (파마킹)

해열, 소염, 진통제

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약 가 보ehm코드 표장단위	대조약 제조사
114		뉴셀콕캡슐 100mg Celecoxib 100mg	1. 골관절염(퇴행성 관절염)의 증상이나 징후의 완화 2. 류마티스 관절염의 증상이나 징후의 완화 3. 강직척추염의 증상 및 징후의 완화 4. 성인의 급성 통증 완화(수술 후, 발치 후 진통) 5. 원발월경통	1. 골관절염(퇴행관절염) : 200 mg을 1일 1회, 또는 1회 100 mg씩 1일 2회 복용 2. 류마티스관절염 : 1회 100 mg 또는 200 mg을 1일 2회 복용 3. 강직척추염 : 200 mg을 1일 1회, 또는 1회 100 mg씩 1일 2회로 나누어 투여 4. 급성 통증 및 원발월경통 : 초기 권장 투여량은 400 mg이며 투여 둘째 날부터는 필요시 권장량으로서 1회 200 mg씩 1일 2회 투여한다.	295 654305130 30C, 100C	세레브렉스 캡슐 (비아트 리스코리아)
		뉴셀콕캡슐 200mg Celecoxib 200mg			443 654305140 30C, 100C	
114		디워렌정 Acetaminophen 325mg tramadol hydrochloride 37.5mg	중등도-중증의 급·만성 통증.	1. 12세 이상의 소아 및 성인 : 초회 용량으로 2정 투여를 권장하며, 그 이후 투여 간격은 최소 6시간 이상으로 하되, 1일 8정을 초과하지 않도록 한다. 2. 노인 : 통상적인 성인 용량을 투여하도록 한다. 단, 75세 이상의 노인은 최소 6시간 이상 간격으로 이 약을 투여하도록 한다.	190 654303650 30T, 300T	울트라셋정 (에스케이 케미칼 생명과학)
114		맥스펜정 Dexibuprofen 300mg	1. 만성 다발성 관절염, 류마티스 관절염 2. 관절증 3. 강직척추염 4. 외상 및 수술 후 통증성 부종 또는 염증 5. 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조	1회 300mg를 1일 2~4회 경구투여 한다. 단, 1일 텍시부프로펜으로서 1,200mg을 초과하지 않는다.	110 654300930 30T, 500T	애니펜정 (안국)
114		멕시캡슐 Meloxicam 7.5mg	1. 통증과 운동실조를 수반하는 골관절염(퇴행성 관절염)의 급성악화시 단기간의 증상치료 2. 류마티스 관절염의 증상치료 3. 강직척추염의 증상치료	골관절염(퇴행성 관절염) : 7.5mg을 1일 1회 경구투여한다. 1일 15mg 까지 증량 가능 류마티스 관절염, 강직척추염 : 15mg을 1일 1회 경구투여한다. 1일 7.5mg으로 감량할 수 있다.	230 654301070 30C, 300C	모빅캡슐 (베링거 인겔하임)
114		아세탑정 Aceclofenac 100mg	류마티스 관절염, 강직척추염, 골관절염 및 견갑상완골의 관절주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증.	1회 100mg을 12시간 마다 1일 2회 복용한다. 긴장해 환자 : 초기 용량으로 1일 100mg을 투여한다.	160 654301800 30T, 300T	에어탈정 (대웅제약)
114		아세탑CR정 Aceclofenac 200mg	류마티스 관절염, 강직척추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 견갑상완골의 관절 주위염, 요통 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증.	1회 200mg을 1일 1회 복용한다.	352 654304650 30T, 100T	클란자CR정 (유나이티드)
114		옥소펜정 Loxoprofen sodium hydrate 68.1mg (60mg as loxoprofen anhydrous)	1. 다음질환 및 증상의 소염·진통 만성 류마티스 관절염, 골관절염 (퇴행성관절염), 요통, 견관절주위염, 경관완증후군 2. 수술후, 외상후 및 발치후의 소염·진통	성인 1회 60 mg을 1일 3회 경구투여한다.	106 654302150 30T, 300T	동화 록소닌정 (동화)
114		플루마겐정 370mg Talinflumate 370mg	류마티스 관절염, 골관절염(퇴행관절염)	1회 370mg를 1일 3회 경구투여 한다. 중증일 경우에는 1회 740mg을 투여한다.	174 654303190 30T, 500T	소말겐정 (알보젠)

항생제

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보험코드 표장단위	대조약 제조사
614		록시맥스정 Roxithromycin 150mg	<ul style="list-style-type: none"> -인후두염, 급성기관지염, 편도염, 세균성 폐렴, 미코플라스마페렴 등 호흡기 감염증 -임균에 의한 감염을 제외한 생식기감염증 및 성병 -중이염, 부비동염 -모낭염, 종기, 종기증, 응종, 단독, 연조직염, 림프관염, 생인손, 화농성 손발톱주위염, 파히농양, 한선염, 응괴성여드름, 감염성 족종 -수막염균성 수막염환자와 접촉한 경우에 감염 예방목적 -치관주위염, 치주조직염 	성인 1회 150mg(역가)을 1일 2회 아침 저녁식전에 경구투여한다. 폐렴의 경우 1일 1회 300mg(역가)을 아침 식전에 투여한다.	505 654300760 30T, 300T	루리드정 (한독)
618		오메크라듀오시럽 50ml 1ml 중 Amoxicillin hydrate 3 6,3143g, clavulanate potassium diluted 5,1878g	<ul style="list-style-type: none"> -급만성기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염 -방광염, 요도염, 신우신염 -골반감염, 임질 -종기 및 농양, 연조직염, 상처감염 -골수염 -치과감염 	<ul style="list-style-type: none"> -재발성 편도염 등의 상기도감염, 하기도감염, 요로감염 및 피부·연조직 감염 등 경증등도 감염 시 1일 kg당 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1일 kg당 25mg/3.6mg을 2회 분복 -중이염, 부비동염 등의 상기도감염, 기관지폐렴 등의 하기도감염 및 요로 감염 등 중증감염 시 통상 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1일 kg당 45mg/6.4mg을 2회 분복 	1ml/69 (3,450) 1ml/69 (3,450) 654304741 50ml/병	오구멘틴 듀오시럽 (일성 아이에스)
618		오메크라정 375mg Amoxicillin hydrate 250mg, clavulanate potassium diluted 212,73mg (125mg as clavulanate potassium)	<ul style="list-style-type: none"> -급만성기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염 -방광염, 요도염, 신우신염 -골반감염, 임질 -종기 및 농양, 연조직염, 상처감염 -골수염 -치과감염 	성인 및 12세 이상 또는 체중 40 kg 이상 소아 : 1회 250 mg/125 mg, 1일 3회 8시간마다 경구투여하며 중증 및 호흡기 감염 시 1회 500 mg/125 mg으로 증량할 수 있다.	300 654304750 80T	오구멘틴정 (일성 아이에스)
618		오메크라정 625mg Amoxicillin hydrate 500mg, clavulanate potassium diluted 212,73mg (125mg as clavulanate potassium)	<ul style="list-style-type: none"> -급만성기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염 -방광염, 요도염, 신우신염 -골반감염, 임질 -종기 및 농양, 연조직염, 상처감염 -골수염 -치과감염 	성인 및 12세 이상 또는 체중 40 kg 이상 소아 : 1회 250 mg/125 mg, 1일 3회 8시간마다 경구투여하며 중증 및 호흡기 감염 시 1회 500 mg/125 mg으로 증량할 수 있다.	483 654304760 40T	
618		킹세프정 cefprozil hydrate 250mg (250mg as cefprozil)	<ul style="list-style-type: none"> -상기도 감염증 : 인두염/편도염, 중이염, 급성부비동염 -하기도 감염증 -피부 및 연조직 감염증 -단순성 비뇨기계 감염 	13세 이상 환자에게는 1회 500mg을 24시간마다 투여하고, 질환에 따라 250mg 또는 500mg을 12시간 마다 투여한다.	592 654304490 30T, 100T	프로세질정 (한비)
619		클로틴정 250mg Clarithromycin 250mg	<ul style="list-style-type: none"> -하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등 -상기도감염증 : 인두염, 부비동염 등 -피부 및 피부조직 감염증 -미코박테륨 아비움, 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증 -십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸 	<ul style="list-style-type: none"> -성인은 보통 1회 250mg(역가) 1일 2회, 중증 감염증의 경우에는 1회 500mg(역가) 1일 2회 투여한다. 투여기간은 보통 7~14일이다. -미코박테리아 감염증 : 1회 500mg(역가), 1일 2회 투여한다. -십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸 : 14일간 500mg(역가) 1일 3회와 오메프라졸 40mg 1일 1회 병용투여 연속하여 14일간 오메프라졸 40mg 1일 1회 투여한다. 클라리트로마이신은 1회 500mg(역가) 1일 3회 14일간 투여, 오메프라졸을 1일 1회 40mg을 28일간 투여한다. 	735 654302870 30T, 100T	클래리시드 필름코팅정 (에보트)

항히스타민제

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보험코드 표장단위	대조약 제조사
141		알씨텍정 5mg Levocetirizine hydrochloride 5mg	생동 1. 계절성 알레르기성 비염 또는 다년성 알레르기성 비염. 2. 만성 특발성 두드러기. 3. 가려움증을 동반한 피부염 및 습진.	식사와 관계없이 1회 1정, 1일 1회 경구투여 한다.	179 654303720 30T, 200T	씨잘정 (한국 유씨비제약)
141		알지렉스정 Cetirizine hydrochloride 10mg	1. 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성결막염, 만성특발성 두드러기, 피부소양증. 2. 하이드로코티손 외용제와 병용에 의한 습진, 피부염.	1일 1회 10mg 취침 전에 경구투여 한다. 이상 반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 분할 투여한다.	107 654301890 500T	지르텍정 (한국 유씨비제약)
141		오스틴 베포타스틴 베실산염정 Bepotastine besilate 10mg	다년성 알레르기성 비염, 만성 두드러기, 피부질환에 수반된 소양증(습진, 피부염, 피부소양증, 양진)	통상 성인에게는 1회 10mg을 1일 1회 경구투여 한다.	126 654305160 30T, 300T	투리온정 (동아제약)
149		루프란정 50mg Pranlukast hydrate 50mg	1. 기관지 천식 2. 알레르기성 비염	1회 50mg을 1일 2회 아침, 저녁 식후 경구투여	447 654305640 30T, 300T	씨투스정 (삼아제약)
149		몬테뉴정 10mg Montelukast sodium 10.4mg (10mg as montelukast)	천식의 방지 및 지속적 치료, 계절 및 연중 알레르기비염 증상완화.	성인 및 15세 이상의 청소년: 1일 1회 10 mg을 경구투여한다.	658 654304640 28T	싱글레어정 (한국오가논)
149		아제틴정 Azelastine hydrochloride 1mg	기관지 천식, 알레르기성비염, 두드러기, 습진, 피부염, 아토피성 피부염, 피부소양증, 가려움.	1회 1mg, 기관지 천식인 경우에는 1회 2mg을 1일 2회 아침 식사 후 및 취침 전에 경구투여 한다.	150 654301820 30T, 300T	부광아 젠티정 (부광약품)
149		에피나정 Epinastine hydrochloride 10mg	생동 1. 기관지천식, 2. 알레르기비염, 3. 두드러기, 습진·피부염, 피부가려움, 가려움발진, 가려움을 동반한 보통 건선.	1. 천식, 두드러기, 습진·피부염, 피부 가려움, 가려움발진(痒疹), 가려움을 동반한 보통건선: 성인 1일 1회 20 mg을 경구 투여한다. 2. 알레르기비염: 성인 1일 1회 10 ~ 20 mg을 경구 투여한다.	439 654304970 30T, 100T	알레스틴정 (동구 바이오제약)

비뇨기계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보험코드 포장단위	대조약 제조사
259		비아리스정 Sildenafil citrate 140.45mg (100mg as sildenafil)	발기부전의 치료.	실데나필로서 1일1회 성행위 약 1시간 전에 25~50mg을 경구투여 한다.	비급여(3,500) 654304600 4T	비아그라정 (비아트 리스코리아)
259		솔리페신정 5mg Solifenacin succinate 5mg	절박성 뇨실금, 빈뇨, 요절박과 같은 과민성방광 증상의 치료.	권장용량은 5mg을 1일 1회 투여한다. 필요한 경우 1일 1회 최대 10mg까지 증량할 수 있다.	735 654305020 30T, 100T	베사케어정 (한국아스 텔라스제약)
259		탐스돌서방정 Tamsulosin hydrochloride 0.2mg	양성 전립샘비대증에 따른 배뇨장애.	1일 1회 0.2mg 식후에 경구투여 한다.	419 654302920 30T, 100T	하루날디정 (한국아스 텔라스제약)
259		테라온정 2mg Terazosin hydrochloride 2.374mg(2mg as terazosin)	양성전립선 비대에 의한 배뇨장애, 고혈압(경증, 중등도)	초회량 취침전 1mg을 경구투여 하며, 이 용량을 초과해서는 안된다. 유지량으로 1일 1회 5~10mg을 투여한다.	303 654304600 30T, 100T	일양 하이트린정 (일양약품)
259		프로베정 Propiverine hydrochloride 20mg	하기질환 또는 아래 상태에 의한 빈뇨, 요실금: 신경인성방광, 신경성빈뇨, 불안정방광, 방광자극상태, 과활동 방광의 소변 절박감, 빈뇨 및 절박성 요실금.	1일 1회 20mg을 식후 경구투여 한다. 20mg을 1일 2회까지 복용할 수 있다.	523 654303180 30T, 100T	비유파-4정 (제일약품)
259		핀스타정 5mg Finasteride 5mg	양성전립샘 비대증.	1일 1회 5mg을 식사와 관계없이 경구투여 한다.	622 654304680 30T	프로스카정 (한국오가논)

정신신경계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보ehm코드 표장단위	대조약 제조사
113		토피렉스정 25mg Topiramate 25mg	1. 간질 1) 단독요법 : 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료 2) 부가요법 : 1차 항진간제 투여로 적절하게 조절이 안 된 다음질환에 사용 - 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 - 레녹스-가스토 증후군과 관련된 발작 - 1차성 강직성/간대성 전신발작 2. 편두통의 예방	1. 간질 1) 단독요법 : 1일 100~200mg 1일 2회 분할투여 2) 부가요법 : 1일 200~400mg 1일 2회 분할투여 2. 편두통의 예방 처음 1주 : 저녁에 25mg 복용 1주 간격으로 25mg 증량(환자가 견디기 어려운 경우 증량간격을 길게 한다). 1일 권장용량은 100mg으로 1일 2회로 분할 투여, 1일 200mg까지 투여가능	345 654304940 30T, 100T	토파맥스정 (한국안센)
119		도네프정 5mg Donepezil hydrochloride monohydrate 5.22mg (5mg as donepezil HCl) 코오통제약	알츠하이머형 치매증상의 치료.	성인 : 도네페질염산염으로서 1일회 5mg씩 취침전 투여한다. 임상적 반응을 평가한 후 10mg까지 증량할 수 있다.	1,500 670300140 30T	아리셉트 (에자이)
119		도네프정 10mg Donepezil hydrochloride monohydrate 10.43mg (10mg as donepezil HCl) 코오통제약			2,203 670300150 30T	
119		마빅스정 Memantine hydrochloride 10mg (8.31mg as memantine)	중등도에서 중증의 알츠하이머병 치료.	1일 최대 용량은 20mg 이며, 이상반응 발생 위험을 최소화 하기위해 처음 3주간에 걸쳐 다음과 같이 주당 5mg씩 증량하여 유지용량에 도달하도록 한다. - 첫째 주: 1일 5mg을 7일간 투여한다. - 둘째 주: 1일 10mg(10mg씩 1일 2회)을 7일간 투여한다. - 셋째 주: 1일 15mg(아침 10mg, 저녁 5mg)을 7일간 투여한다. - 넷째 주: 1일 20mg(10mg씩 1일 2회)을 투여한다. 유지용량은 1일 20mg(10mg씩 1일 2회)이다.	540 654300860 30T, 100T	에빅사정 (한국루덴백)

항진균제 · 항바이러스제

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능 · 효과	용법 · 용량	약 가 보험코드 포장단위	대조약 제조사
629		다코나졸캡슐 Fluconazole 50mg	<p>생동</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 급성 또는 재발성 질칸디다증, 칸디다뇨증, 구강칸디다증, 점막칸디다증 2. 칸디다혈증, 전신성 칸디다증 3. 손 · 발톱진균증, 무좀, 체부백선, 완선, 어루러기 및 피부진균 감염증 등 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 질칸디다증 : 1일 1회 150mg 2. 손 · 발톱진균증 : 1주 1회 150mg, 손 · 발톱이 다시 자랄때 까지 투여 (상세한 용법용량은 설명서 참조) 	1,784 654300340 30C, 100C	디푸루칸 캡슐 (화이자)
629		이라코나정 Itraconazole Solid Dispersions 253mg (100mg as itraconazole) 건일바이오팜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 칸디다성 질염. 2. 어루러기. 3. 피부사상균에 의한 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선, 족부백선. 4. 구강칸디다증. 5. 진균성각막염. 6. 손발톱진균증. 7. 다음과 같은 전신진균감염증 : 아스페르길루스증, 칸디다증, 크립토크쿠스증 (크립토크쿠스 수막염포함), 파라콕시디오이드미시스증. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 칸디다질염 : 1회 200mg 1일 2회 1일 투여 또는 1회 200mg 1일 1회 3일 투여 2. 어루러기 : 1일 1회 200mg 7일간 투여 3. 체부백선, 고부백선(완선) : 1일 1회 100mg 15일 투여 4. 수부백선(지간형), 족부백선(지간형) : 1일 1회 100mg 15일 투여 5. 수부백선(손바닥), 족부백선(발바닥) : 1일 1회 100mg 30일 투여 또는 1회 200mg을 1일 2회 7일간 투여 6. 구강칸디다증 : 1일 1회 100mg 15일 투여 7. 진균성각막염 : 1일 1회 200mg을 2일 투여 	1,078 073000530 28T, 100T	
629		팜시빌정 Famciclovir 250mg	대상포진 바이러스 감염증. 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제	1회 250mg 1일 3회 7일간 경구투여 한다. 질환에 따라 1회 250mg, 1일 2~3회 5일간 경구투여 한다.	3,847 654303050 21T	팜비어정 (일동제약)
629		발렉스정 500mg Valaciclovir hydrochloride 556mg (500mg as valaciclovir)	대상포진 바이러스 감염증, 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제.	질환에 따라 1회 500~1,000mg을 1일 2~3회, 7일간 경구투여 한다.	1,187 654304370 30T	발트렉스정 (글락소스 미스클라인)

피부계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보험코드 표장단위	대조약 제조사
259		핀스타정 1mg Finasteride 1mg	성인남성(만 18~41세)의 남성형 탈모증(안드로겐 탈모증)의 치료	1일 1회 1mg 경구 투여	비급여(700) 654305450 30T	프로페시아정 (한국오가논)
264		모메손크림 mometasone furoate 1mg/g	코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화.	1일 1회 환부에 얇게 바르고 완전히 스며들 때까지 가볍게 문지른다. 밀봉 봉대법은 삼가한다.	2,895/5,790 654301131/ 654301133 15g/30g	에로콤크림 (한국오가논)
264		베스톱크림 Prednicarbate 2.5mg/g	습진·피부염군(아토피피부염, 지루피부염, 접촉성알러지피부염, 유사건선, 편평태선, 가려움발진 포함), 건선.	1일 1~2회 환부에 얇게 바르고 가볍게 문질러 준다. 4주 이상(소아의 경우 3주 이상)계속해서 투여하지 않는다.	2,370/79,000 654301251/ 654301253 15g/500g	더마톱크림 (한독)
265		다나핀크림 Butenaline hydrochloride 10mg/g	다음의 피부진균증 1. 백선: 족부백선, 고부백선(완선), 체부백선. 2. 어루러기.	1일 1회 환부에 바른다.	5,200/104,000 654300087/ 654300085 25g/500g	
265		센다실크림 1% Terbinafine hydrochloride 10mg/g	1. 피부사상균에 의한 피부 진균감염증 : 족부백선, 고부백선(완선), 체부백선 2. 어루러기 3. 피부칸디다증	1일 1~2회 환부에 도포한다. 1. 족부백선 : 1일 1회, 1주 시간형(발가락사이) 족부백선 : 1일 2회 1주 족저형(발바닥) 족부백선 : 1일 2회, 2주 2. 체부백선, 고부백선 : 1~2주 3. 피부칸디다증 : 1~2주 4. 어루러기 : 2주	2,100/52,500 654301752/ 654301754 20g/500g	
332		멜라스민캡슐 Tranexamic acid 250mg	생동 1. 백혈병, 재생불량성 빈혈, 자반병, 암 등 및 수술 중·수술 후의 이상 출혈. 2. 폐출혈, 성기출혈, 신출혈, 전립선 수술 중·수술 후의 이상 출혈.	1일 750~2,000mg을 3~4회에 분할 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	비급여(225) 654305290 30C, 100C	도란사민캡슐 (제일약품)

근골격계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보험코드 표장단위	대조약 제조사
122		에페솔정 Eperisone hydrochloride 50mg	1. 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육 연축 : 경관완중후군, 견관절주위염, 요통 2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관 장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 이급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질환	1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여 한다.	98 654301970 30T, 1000T	뮤렉스정 (초당)
399		티토넬정 35mg Risedronate sodium 35mg	1. 폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방. 2. 남성의 골다공증 치료.	1일 1회 35mg로 1주 1회 경구투여 한다.	4,308 654303670 4T	악토넬정 (동아에스티)

호흡기용제

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보ehm코드 포장단위	대조약 제조사
222		레보드롭정 Levodropizine 60mg	다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염	1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간을 간격을 두고 경구투여 한다.	98 654300670 30T, 200T	드로피진정 (코오롱제약)
222		아세틸캡슐 Acetylcysteine 200mg	다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증	성인 : 1회 200mg 1일 2~3회 소아 : 6~14세 1회 100~200mg 1일 2회	81 654304730 500C	뮤테란캡슐 (한화제약)
222		엘도텍캡슐 Erdosteine 300mg	급·만성 호흡기 질환에서의 점액용해(녹임) 및 거담.	1회 300mg를 1일 2~3회 경구투여 한다. 급성 호흡기질환에 투여시 연속으로 10일 이상 투여하지 않는다.	196 654301990 30C, 300C	엘도스캡슐 (대웅제약)
222		오스틴 암브록솔염산염정 Ambroxol hydrochloride 30mg	점액분비장애로 인한 다음의 급·만성 호흡기질환 : 급·만성기관지염, 천식성기관지염	1회 30mg, 1일 3회 복용한다. 계속 치료시 1회 30mg 1일 2회 복용한다.	38 654302270 1000T	뮤코펙트정 (오펠라헬스 케어코리아)
229		뉴세필캡슐 Acebrophylline 100mg	기도폐쇄 장애 및 점액분비로 인한 급·만성호흡기질환, 급·만성기관지염, 기관지천식, 부비동염, 간성비염.	1회 100mg을 1일 2회 투여한다.	179 654300240 30C, 300C	설포라제캡슐 (현대약품)

내분기계

분류	제품사진	제품명 (성분함량)	효능·효과	용법·용량	약가 보ehm코드 포장단위	대조약 제조사
245		히든정 Hydrocortisone 10mg	내분비 장애, 류마티스성 장애, 교원성 질환, 부종성 질환, 중증감염증, 혈액 질환, 간질환, 호흡기 질환, 뇌/신경질환, 피부 질환, 안과 질환, 이비인후과 질환.	1일 10~120mg, 1~4회 분할 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	94 654303490 30T, 100T	하이손정 (대우제약)
396		글리엠 정 2/500mg Glimepiride 2mg metformin hydrochloride 500mg	인슐린 비의존성 당뇨병(제2형)환자에서 식이요법 및 운동요법과 병행.	식사 직전 또는 식사와 함께 1일 1~2회 투여.	167 654304510 30T	아마릴엠정 (한독)
399		미시랜더캡슐 green tea powder 250mg (5mg as caffeine), orthosiphon powder 150mg	비만 또는 과체중시 체중감량(줄임) 보조제.	성인 1회 1~2캡슐, 1일 3회 식사 중에 큰 컵으로 물 한 컵과 함께 복용한다.	비급여(110) 654301160 500C	

We work with happy and do things
that make our happy.

건강하고 행복한 삶에 오스틴제약이 함께 하겠습니다.



www.jeyak.co.kr

• 서울 사옥 : 서울시 성동구 광나루로 172, 린하우스 3층
• 안산 공장 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20

Tel. 02-866-7773(代)
Tel. 031-494-9681

Fax. 031-494-5401